

Impfkalender 2019/2020 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2019



Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)



Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)



Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)					Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)					Erwachsene (ab 18 Jahre)					
	6 Wochen	2 Monate	U4 3 Monate	4 Monate	U6 11–14 Monate	U7 15–23 Monate	2–4 Jahre	U9 5–6 Jahre	J1 9–14 Jahre	15–16 Jahre	17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre			
Rotaviren >	G1 ^a	G2	G3													
Tetanus >		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2		N	A (alle 10 Jahre)					
Diphtherie >		6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	N	A1	A2		N	A (alle 10 Jahre)					
Keuchhusten (Pertussis) >						N	A1	A2		N	A ^d					
Hib (Haemophilus influenzae Typ b) >										N						
Kinderlähmung (Poliomyelitis) >										N		A		N	ggf. N	
Hepatitis B >						N										
Pneumokokken >		G1 ^b		G2	G3	N						S ^f				
Meningokokken C >					G (ab 12 Monaten)		N									
Masern >					G1	G2	N						S ^e			
Mumps >					3-fach-Impfung MMR	3-fach-Impfung MMR + Windpocken	N									
Röteln >								N								
Windpocken (Varizellen) >					G1	G2	N									
HPV (Humane Papillomviren) >								G1+G2 ^c	N ^c							
Gürtelrose (Herpes zoster) >											G1+G2 ^h					
Grippe (Influenza) >							Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere					S (jährlich)				

U Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder

J Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche

G Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1–G4)

N Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)

S Standardimpfung

A Auffrischimpfung

a die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

c 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 - 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter > 14 Jahre sind 3 Impfungen erforderlich

d einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis

e Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit

f Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff

h Zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten.